

* داروهای کورتیکواستروئید *

داروهای کورتیکواستروئید (کورتون ها) داروهایی هستند که به عنوان ضد التهاب در بیماری هایی مانند التهاب پلک و قرنیه چشم و هم چنین همراه با داروهای ضد سرطان به عنوان درمان استفاده می شود که از عوارض آن تضعیف سیستم ایمنی می باشد.

از جمله این داروها می توان پردنیزولون و دگزامتازون را نام برد که پردنیزولون به صورت قرص و دگزامتازون به صورت قرص و آمپول موجود است.

جذب این داروها از طریق مجرای گوارش صورت می گیرد و سوخت و ساز آن ها در کبد انجام می شود.

➤ عوارض جانبی این داروها شامل موارد ذیل است:

۱. خونریزی از بینی

۲. سر درد

۸. قند بالا

۹. کاهش کلسیم خون

۱۰. سوزش سردل

۱۱. عوارض جانبی

۱۲. ضعف عضلانی

۱۳. چاقی

۱۴. افزایش موهای زائد

البته باید توجه داشت که این عوارض در همه موارد و همه بیماران مشاهده نمی شود و ضروری

تذکر مهم

- با توجه به اینکه این داروها موجب تضعیف سیستم ایمنی شده و استعداد ابتلا به عفونت (مخصوصا عفونت مخفی) را بالا می برد ، از تماس با افراد مبتلا به بیماری های عفونی (مثل آنفلوانزا یا آبله مرغان) خودداری کرده و در صورت تماس بیمار یا بروز هرگونه احساس بیحالی و تب سریعا به پزشک معالج مراجعه نمایید.
- لازم به ذکر است که این داروها در درمان بیماری فرزند شما نقش به سزایی دارد.
- به هیچ عنوان دارو را یکباره و ناگهانی قطع نکنید.
- با توجه توصیه های پزشک معالج در رعایت نکات ذکر شده تا حد زیادی می

۵. دارو را در ظرف تیره و دور از تابش نور در دمای ۳۰ - ۱۵ درجه سانتی گراد (دمای اتاق) نگه دارید.

۶. کنترل فشار خون ۲ بار در روز انجام شود.

۷. از آسپرین استفاده نشود.

۸. در صورت مشاهده درد معده و سوء هاضمه با

پزشک خود مشورت کنید و از خود درمانی

پرهیزید.

۹. در درمان طولانی مدت مراجعه به دندان پزشک

ضروری است.

۱۰. لازم است فرد بیمار کارت مشخصات شامل

مشخصات فردی ، نوع بیماری ، داروی مصرفی و

نام پزشک را همیشه همراه خود داشته باشد.

۱۱. مراجعه منظم به پزشک طبق دستور داده شه



شماره ۱۴

*** توصیه ها به بیماران تحت درمان
با کورتیکواستروئید (کورتون) ***

دانشگاه علوم پزشکی بابل
بیمارستان کودکان امیرکلا

AMIRKOLAmuBABOL.AC.IR

تلفن گویا : ۵-۲۱۵۲-۳۲۳۴۲۱-۱۱

فاکس: ۰۶۵۶-۳۲۳۴۰-۱۱

